1. NOME DO MEDICAMENTO

LacTEST 0,45 g pó para solução oral

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Uma saqueta contém 0,45 g de gaxilose.

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA

Pó para solução oral branco ou quase branco.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1. Indicações terapêuticas

Este medicamento é apenas para uso diagnóstico.

LacTEST é indicado para o diagnóstico de hipolactasia em crianças e adolescentes com idade igual ou superior a 6 anos, adultos e idosos que apresentem sintomas clínicos de intolerância à lactose.

4.2. Posologia e modo de administração

Este medicamento deve ser prescrito por um pediatra ou médico com experiência no tratamento da hipolactasia e só deve ser administrado por profissionais de saúde devidamente autorizados e sob supervisão médica adequada.

Posologia

Em adultos, doentes idosos e adolescentes com idade igual ou superior a 12 anos e crianças com idades entre 6 e 11 anos, 0,45 g de gaxilose administrados por via oral.

População pediátrica

Não é necessário ajuste da dose.

A segurança e eficácia de LacTEST em crianças com 0 a 5 anos de idade não foram estabelecidas. Não existem dados disponíveis.

Doentes com compromisso renal

A segurança e eficácia de LacTEST em doentes com compromisso renal não foram estabelecidas (ver secção 4.4). Em doentes com doença renal grave, a utilização de LacTEST está contraindicada (ver secção 4.3).

Doentes com compromisso hepático

A segurança e eficácia de LacTEST em doentes com compromisso hepático não foram estabelecidas. Em doentes com hipertensão portal (ascite, cirrose), a utilização de LacTEST está contraindicada (ver secção 4.3).

Modo de administração

Precauções a tomar antes de manusear ou administrar LacTEST

Dissolver cuidadosamente todo o conteúdo de uma saqueta em cerca de 100 ml de água. Será obtida uma solução límpida e incolor. O doente deve beber imediatamente esta solução e a hora da ingestão deve ser registada. A urina total de 0 a 5 horas será recolhida.

A realização do teste terá a seguinte sequência: o doente esvaziará a bexiga duas horas antes do teste, e novamente 15-30 minutos antes do início do mesmo. O medicamento LacTEST será administrado. A partir desse momento, o doente deve ingerir até 500 ml de água para facilitar a diurese e recolherá a urina num recipiente adequado durante as 5 horas seguintes e esvaziará a bexiga antes do fim do teste. Isto vai permitir determinar a quantidade total de xilose na urina acumulada de 0 a 5h. Se o doente vomitar durante a realização do teste, é necessário repeti-lo. Se for necessário repetir o procedimento, não deve ser feito até que tenham passado, pelo menos, 3 dias.

Para a preparação do doente, ver secção 4.4.

Para instruções acerca da reconstituição do medicamento antes da administração e instruções de utilização, ver secção 6.6.

4.3. Contraindicações

- Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1.
- Galactosemia
- Pentosúria
- Doentes que têm uma doença renal grave, hipertensão portal (ascite, cirrose), mixedema (hipotiroidismo grave) ou registos médicos de gastrectomia total e/ou vagotomia.

4.4. Advertências e precauções especiais de utilização

Doentes com compromisso renal

A utilização de LacTEST não é recomendada em adultos e idosos com função renal anormal (comprovada por medição prévia da taxa de filtração glomerular), uma vez que a excreção renal de xilose pode estar reduzida e a segurança e eficácia de LacTEST não foram estabelecidas nestas populações.

População pediátrica

Para informações sobre a utilização na população pediátrica, ver secção 4.2.

A utilização de LacTEST não é recomendada em crianças entre os 6 e 11 anos e adolescentes com idade igual ou superior a 12 anos com função renal anormal, uma vez que a excreção renal de xilose pode estar reduzida e a segurança e eficácia de LacTEST não foram estabelecidas nesta população.

Preparação do doente

Durante a realização do teste à urina, será solicitado aos doentes que bebam até 500 ml de água para facilitar a diurese. Os doentes devem estar em jejum nas 10 horas anteriores ao início do teste e durante a sua realização. Uma vez que foi notificado que tanto a aspirina como a indometacina diminuem a excreção urinária de xilose, será solicitado aos indivíduos que evitem tomar qualquer um destes fármacos, pelo menos, 48 horas antes da realização do teste de gaxilose e até à conclusão do teste.

As crianças dos 6 aos 11 anos devem tomar um pequeno-almoço pobre em hidratos de carbono, sem lactose, xilose e arabinose, 3 horas antes da ingestão de Gaxilose, contendo todas ou algumas das seguintes refeições: arroz branco, ovo estrelado, peito de frango grelhado e presunto serrano/serrano sem lactose.

Advertências específicas

Uma vez que a eliminação urinária de xilose pode ser reduzida em doentes com função renal insuficiente, é obrigatório avaliar os doentes para detetar qualquer potencial disfunção renal quando há suspeita dessa insuficiência.

4.5. Interações medicamentosas e outras formas de interação

Não foram realizados estudos de interação.

Foi notificado que tanto a aspirina como a indometacina diminuem a excreção urinária de xilose; assim, será solicitado aos indivíduos que evitem a ingestão de qualquer um destes fármacos, pelo menos, 48 h antes da ingestão de LacTEST 0,45 g e até à conclusão do teste.

A possibilidade de interação entre LacTEST 0,45 g e alimentos contendo arabinose não pode ser totalmente descartada; portanto, os doentes serão alertados para a necessidade de evitar a ingestão de alimentos que contenham arabinose, pelo menos, 10 horas (máximo de 24 horas) antes da ingestão de LacTEST 0,45 g e até à conclusão do teste.

População pediátrica

Não foram realizados estudos de interação.

4.6. Fertilidade, gravidez e aleitamento

Gravidez

Não é esperado nenhum efeito durante a gravidez uma vez que a exposição sistémica à gaxilose é insignificante.

LacTEST pode ser utilizado durante a gravidez.

Amamentação

Não é esperado nenhum efeito durante a amamentação uma vez que a exposição sistêmica à gaxilose é insignificante.

LacTEST pode ser utilizado durante a amamentação.

4.7. Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Os efeitos de LacTEST sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos ou desprezáveis.

4.8. Efeitos indesejáveis

O programa clínico de gaxilose consistiu em 3 estudos em voluntários saudáveis e na população-alvo em que 540 indivíduos receberam gaxilose oral (113 mg – 5,4 g) e 12 receberam placebo. Não foram detetados acontecimentos adversos graves relacionados com o tratamento, nem acontecimentos que tenham resultado em interrupção. Apenas 13 acontecimentos adversos foram considerados como provável ou possivelmente relacionados com o medicamento sob investigação, e nenhum levou à interrupção. Quatro deles foram de intensidade moderada (prurido e urticária) e 9 foram ligeiros (distensão abdominal, dor abdominal, vômitos, diarreia, náuseas e enxaqueca).

Foi realizado um ensaio clínico de fase IV na população-alvo. Um total de 74 doentes foram expostos a 0,45 g de gaxilose, e 70 receberam uma segunda dose semelhante de gaxilose com um período de depuração de 5+/- 2 dias. No primeiro teste, ocorreram 37 acontecimentos adversos relacionados com a gaxilose (24 ligeiros e 13 moderados) em 22 doentes (29,73% dos doentes que realizaram o primeiro teste). No segundo teste, foram notificados 15 acontecimentos adversos relacionados com a gaxilose (12 ligeiros e 3 moderados) em 8 doentes (11,43% dos doentes que repetiram o teste da gaxilose). Não foram notificados acontecimentos adversos graves.

Os acontecimentos adversos notificados estão listados na tabela em baixo de acordo com as frequências e classes de sistemas de órgãos.

As frequências dos acontecimentos adversos estão classificadas de acordo com o seguinte: Muito frequentes ($\geq 1/10$); Frequentes ($\geq 1/100$, $< 1/10$); Pouco frequentes ($\geq 1/1000$, $< 1/100$), Raros ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1000$); Muito raros ($< 1/10\ 000$); Desconhecido (não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis).

Classes de Sistemas de Órgãos e frequência	Acontecimentos Adversos
Doenças do sistema nervoso Pouco frequentes Frequência desconhecida*	Cefaleia. Tonturas, síncope.
Doenças gastrointestinais Pouco frequentes Frequência desconhecida*	Distensão abdominal, dor abdominal, náuseas, diarreia, vômitos. Flatulência, desconforto abdominal, dor no abdômen superior, sons gastrointestinais.

Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos: Pouco frequentes Frequência desconhecida*	Prurido, urticária. Erupção cutânea.
---	---

*Nota: Os acontecimentos adversos indicados com "Frequência desconhecida" são aqueles que surgiram durante o ensaio clínico de Fase IV. Não existem dados suficientes disponíveis.

Na população dos 6 aos 11 anos de idade em voluntários saudáveis, nenhum dos efeitos indesejáveis observados durante o estudo estava relacionado com a Gaxilose.

Notificação de suspeitas de reações adversas

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P.:

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>
(preferencialmente)
ou através dos seguintes contactos:
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 73 73
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)
e-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

4.9. Sobredosagem

Devido ao facto de apenas serem ingeridos 0,45 g de gaxilose, não se espera uma sobredosagem.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1. Propriedades farmacodinâmicas

Grupo farmacoterapêutico: 19.4. – Meios de diagnóstico. Meios de diagnóstico não radiológico.
Código ATC: VO4CX.

Não foi descrita nenhuma atividade farmacodinâmica para a quantidade de 0,45 g de gaxilose.

LacTEST é um método não invasivo que permite avaliar in vivo a atividade geral da lactase intestinal através da determinação colorimétrica da xilose na urina ou no sangue após administração oral de 4-O-β-D-galactopiranosil-D-xilopiranosose (gaxilose), um dissacárido produzido por síntese enzimática que funciona como um análogo estrutural da lactose, o substrato fisiológico da lactase intestinal. Alternativamente, a xilose em amostras de urina também pode ser medida através de um método enzimático. Após administração oral, a gaxilose é hidrolisada pela enzima

da mucosa intestinal em galactose e xilose, e estes produtos da hidrólise fisiológica passam para o sangue. O aparecimento de xilose na urina está estreitamente relacionado com os níveis de atividade da lactase intestinal determinados post mortem em estudos em animais, portanto, o uso da gaxilose permite avaliar in vivo a atividade desta enzima.

O ponto crítico para classificar os doentes como tendo normolactasia ou hipolactasia através deste teste de diagnóstico é o seguinte: considera-se que os doentes com uma quantidade total de xilose excretada na urina de 0-5 horas igual ou superior a 37,87 mg de xilose têm normolactasia, se a xilose for determinada pelo método do floroglucinol. Se a xilose for quantificada pelo método enzimático Xylossay ou pelo método electroquímico Osaxyl, os doentes são considerados normolactásicos quando a quantidade de xilose na urina de 0-5 horas for igual ou superior a 19,18 mg. Se a quantidade de xilose for inferior aos valores anteriores (de acordo com o método utilizado), considera-se que o doente tem hipolactasia.

5.2. Propriedades farmacocinéticas

Após administração oral, este composto é hidrolisado pela enzima da mucosa intestinal em galactose e xilose, e estes produtos da reação fisiológica passam para o sangue.

Absorção

A gaxilose não é absorvida pela mucosa intestinal como descrito anteriormente. Este composto é hidrolisado pela lactase intestinal nos seus constituintes monossacáridos galactose e xilose, que são absorvidos pela mucosa intestinal, transportados para o sangue e um deles, a xilose, é eliminado na urina.

Distribuição

O produto é hidrolisado pela lactase intestinal em galactose e xilose que, após serem absorvidas, passam para a corrente sanguínea e seguem vias fisiológicas normais. A galactose é transformada em glucose no fígado e a xilose é parcialmente metabolizada de maneira endógena [cerca de 50% da xilose ingerida independentemente da dose e idade, demonstrado em estudos em animais], e o resto surge no sangue e é finalmente eliminado na urina. O dissacárido não hidrolisado é eliminado através do intestino.

Metabolismo

Para a avaliação da taxa de metabolização da gaxilose e da medida em que a xilose produzida é metabolizada, foi necessário estudar previamente a assimilação da xilose em ratos aos 15, 18 e 30 dias de idade avaliando a proporção em que este monossacárido é recuperado na urina. Observou-se que aproximadamente 48% da xilose administrada é eliminada na urina.

Um ensaio clínico realizado em 12 voluntários saudáveis (que receberam 113, 225, 450, 900, 2700 e 5400 mg de gaxilose e placebo) mostrou claramente que a ingestão de gaxilose foi seguida pelo aparecimento de xilose no sangue e na urina, de tal forma que dependia da dose oral administrada. Isto evidencia que o dissacárido sintético é um substrato in vivo da atividade da lactase intestinal em seres humanos e que pode ser utilizado para a avaliação não invasiva desta atividade enzimática. A dose mínima de gaxilose para uma deteção fiável de xilose na urina foi de 450 mg, para garantir a colheita de uma quantidade suficiente de xilose eliminada.

Eliminação

A xilose é absorvida passivamente no intestino delgado e, embora uma parte seja metabolizada (como indicado acima), o resto é eliminado na urina.

Compromisso renal/hepático

A farmacocinética em doentes com compromisso renal ou hepático não foi caracterizada.

5.3. Dados de segurança pré-clínica

Os ensaios com diferentes doses em animais não detetaram toxicidade com doses elevadas. A dose letal 50 em ratos e ratinhos, tanto por via oral como por via intravenosa, foi superior a 4000 mg/kg.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1. Lista dos excipientes

Não existentes.

6.2. Incompatibilidades

Este medicamento não pode ser misturado com outros medicamentos.

6.3. Prazo de validade

Saquetas fechadas: 4 anos.

Após reconstituição, a solução deve ser utilizada imediatamente.

6.4. Precauções especiais de conservação

Saquetas fechadas. O medicamento não necessita de qualquer temperatura especial de conservação.

Manter as saquetas dentro da embalagem exterior.

Condições de conservação do medicamento após reconstituição, ver secção 6.3.

6.5. Natureza e conteúdo do recipiente

Apresentação de uma saqueta para utilização única.

Saquetas constituídas por Papel revestido/Alumínio/Polietileno e Polietileno/Poliéster, contendo 0,45 g de gaxilose

6.6. Precauções especiais de eliminação e manuseamento

A medição dos níveis de xilose nas amostras de urina colhidas de 0-5 horas pode ser realizada usando o kit enzimático (Xylossay) com os analisadores automáticos, o método eletroquímico (Osaxyl) com PoC ou usando a técnica manual de floroglucinol descrita a seguir. Doentes com uma quantidade total de xilose excretada na urina de 0-5 horas igual ou superior a 19,18 mg de xilose, usando o kit enzimático Xylossay ou o método eletroquímico Osaxyl, e igual ou superior a 37,87 mg de xilose, quantificada usando o método manual do floroglucinol, são considerados normolactásicos. Caso a quantidade de xilose seja inferior aos valores anteriores (de acordo com o método utilizado), o doente será considerado hipolactásico.

Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais.

Análise de amostras e especificação do ensaio para laboratórios

Determinação da xilose usando o kit enzimático (Xylossay) com analisadores automáticos

O kit enzimático para quantificação da xilose inclui os seguintes reagentes:

Frasco 1. Tampão fosfato 50 mM, pH 8,0 (solução)

Frasco 2. NAD⁺ liofilizado

Frasco 3. Enzima xilose desidrogenase liofilizada

Frasco 4. Calibrador: Solução padrão de xilose (3,75 mg/dl)

Preparação dos reagentes do kit

Importante: a preparação dos reagentes deve ser realizada na seguinte posição.

1. Adicionar tampão fosfato (frasco 1) ao frasco 3, para dissolver a enzima liofilizada na concentração final de 0,24 mg/ml. Misturar cuidadosamente para evitar perda de atividade na enzima suspensa. Manter frio durante a utilização, se possível. Este será chamado de REATIVO 2.
2. Adicionar tampão fosfato (frasco 1) ao frasco 2 (NAD⁺ liofilizado) e misturar até estar totalmente dissolvido (vórtice, se necessário).
3. Adicionar o NAD⁺ totalmente dissolvido (NAD⁺ + tampão) ao frasco 1. Assim, o frasco 1 irá conter tampão fosfato mais NAD⁺ na concentração adequada para os ensaios (3,4 mg/ml). Manter frio durante a utilização, se possível. Este será chamado de REATIVO 1.
4. A solução-padrão de xilose está pronta a ser utilizada.

Protocolo de ensaio do analisador automático:

Preparação das amostras: Todas as amostras de urina devem ser agitadas depois da descongelação e centrifugadas para homogeneizar e eliminar qualquer precipitado que possa afetar o ensaio.

Configurações do instrumento: Cinética de reação com dois reagentes (R1 e R2), parâmetro de reação, comprimento de onda de 340 nm. A reação será realizada à temperatura-padrão do dispositivo (normalmente 37 °C). A aplicação instrumental para testes deve ser concebida e incorporada pelo responsável técnico da equipa, de acordo com as seguintes especificações:

PROTOCOLO DE ENSAIO DO ANALISADOR GERAL:

Neste protocolo, o volume final da reação (V_R) é a adição dos volumes do reativo 1, reativo 2 e água destilada (para o branco), amostra ou calibrador de xilose.

Passo	Reativo	Branco	Calibrador	Amostra
1	Água destilada	$0,175 \times V_R \mu\text{l}$	-	-
	REATIVO I (tampão fosfato +NAD ⁺)	$0,725 \times V_R \mu\text{l}$	$0,725 \times V_R \mu\text{l}$	$0,725 \times V_R \mu\text{l}$
	Amostra (Urina)	-	-	$0,175 \times V_R \mu\text{l}$
	Calibrador de Xilose (3,75 mg/dl)	-	$0,175 \times V_R \mu\text{l}$	-
Misturar a reação e incubar durante 5 min. Depois, ler a absorvância (A1)				
2	REATIVO 2 (Xilose desidrogenase)	$0,1 \times V_R \mu\text{l}$	$0,1 \times V_R \mu\text{l}$	$0,1 \times V_R \mu\text{l}$
Misturar a reação, incubar durante 5 min e ler a absorvância final (A2)				
Nota: Cada vez que a xilose é medida em amostras de urina, devem ser realizados controlos de xilose após a calibração. Estes controlos, um de baixa concentração e o segundo de alta concentração, devem ser medidos como se fossem amostras.				

Exemplo para $V_R = 200 \mu\text{l}$:

Passo	Reativo	Branco	Calibrador	Amostra
1	Água destilada	35 μl	-	-
	REATIVO I (tampão fosfato +NAD ⁺)	145 μl	145 μl	145 μl
	Amostra (Urina)	-	-	35 μl
	Calibrador de Xilose (3,75 mg/dl)	-	35 μl	-
Misturar a reação e incubar durante 5 min. Depois, ler a absorvância (A1)				
2	REATIVO 2 (Xilose desidrogenase)	20 μl	20 μl	20 μl
Misturar a reação, incubar durante 5 min e ler a absorvância final (A2)				
Nota: Cada vez que a xilose é medida em amostras de urina, devem ser realizados controlos de xilose após a calibração. Estes controlos, um de baixa concentração e o segundo de alta concentração, devem ser medidos como se fossem amostras.

Observação: o protocolo apresentado foi elaborado de acordo com especificações gerais. Contudo, os volumes e diluições finais dos reativos podem ser diferentes entre os analisadores, desde que as suas concentrações e proporções finais sejam mantidas na mistura final do ensaio (2,46 mg/ml de NAD⁺, 0,024 mg/ml de xilose desidrogenase, tampão de fosfato 50 mM).

Cálculos:

Quantidade total de xilose em amostras de urina

Perfil de ensaio típico:

Serão registados dois valores de Absorvância (340 nm) de cada ensaio:

- A1 = Absorvância inicial da mistura REATIVO 1 + Amostra (incubada 5 min.)
- A2 = Absorvância final após adição do REATIVO 2 (incubada 5 min.)

As diferenças entre os dois valores de Absorvância são proporcionais à concentração de xilose que pode ser calculada usando a solução padrão de xilose fornecida como referência:

- ΔAbsorvância (340 nm) = ΔAbs = A2 - A1
- Concentração de xilose na Amostra (Urina) = [Amostra] (mg/dl)
- Concentração de xilose na solução Padrão = 3,75 mg/dl

$$[Amostra] \left(\frac{mg}{dl} \right) = \frac{\Delta Abs (Ensaio da amostra)}{\Delta Abs (Calibrador)} \times 3,75 \text{ mg/dl}$$

A quantidade total de xilose na Amostra (mg) será calculada a partir do seu volume total:

$$Xilose (mg) = [Amostra] \left(\frac{mg}{dl} \right) \times Amostra \text{ de volume (dl)}$$

Exemplo:

Determinação da quantidade total de xilose numa amostra de urina:

- Volume total da amostra (urina) = 557 ml = 5,57 dl

1) Ensaio da amostra: A1 = 0,122

A2 = 0,146

$$\Delta Abs (Ensaio da amostra) = 0,146 - 0,122 = 0,024$$

2) Ensaio-padrão: A1 = 0,087

A2 = 0,166

$$\Delta Abs (Calibrador) = 0,166 - 0,087 = 0,079$$

$$[Amostra](mg/dl) = \frac{0,024}{0,079} \times 3,75 \text{ mg/dl} = 1,139 \text{ mg/dl}$$

$$\text{Xilose (mg)} = 1,139 \frac{\text{mg}}{\text{dl}} \times 5,57 \text{dl} = \mathbf{6,34 \text{ mg}}$$

Valores normais em crianças e adolescentes com mais de 6 anos, adultos e doentes idosos

Teste	Xilose na urina (mg)
LacTEST 0,45 g	$\geq 19,18$

Valores abaixo de 19,18 mg são considerados indicativos de hipolactasia.

Nota:

Considerações a ter em conta relativamente à conservação de amostras de urina.

- 1- Recomenda-se a conservação das amostras de urina para medição da xilose a 4 °C, caso a determinação seja realizada no dia; ou caso contrário, quando a medição não é realizada no dia, as amostras devem ser conservadas a -20 °C ou -70 °C (as amostras permanecerão estáveis durante, pelo menos, 2 meses após a congelação).
- 2- Se for necessário repetir as medições, as amostras podem ser congeladas e descongeladas pelo menos três vezes num período de 2 meses.

Validação do método de quantificação de xilose na urina usando o kit enzimático (Xylossay)

Parâmetros analíticos(*)	
Extensão da curva de calibração	Desde 0,25 a 15 mg/dl
Linearidade	$r^2 \geq 0,9996$
Limites	Limite do Branco: 0,046 - 0,072 mg/dl Limite de Detecção: 0,13 - 0,49 mg/dl Limite de Quantificação: 0,42 - 1,64 mg/dl
Precisão (coeficientes de variação)	Precisão na mesma determinação < 13,6% Precisão entre determinações < 11,5%
Exatidão (percentagem do valor nominal)	Exatidão na mesma determinação $\leq 12\%$ Exatidão entre determinações $\leq 5,9\%$
Transferência	3,3 - 4,0%
Erro	0,095 - 0,76%

*Intervalo de dados calculados a partir de 3 analisadores automáticos diferentes.

Nota: Antes de implementar o teste enzimático num analisador específico, deve realizar-se a validação analítica seguindo as Diretrizes atuais aprovadas.

Determinação de xilose pelo método eletroquímico (Osaxyl)

A deteção eletroquímica inclui o seguinte:

- Osaxil7000. Leitor para deteção quantitativa de xilose em amostras de urina.

- Tiras de teste Osaxyl. Tiras pré-calibradas para uso único no Osaxyl7000.
- Célula fictícia.
- Carregador.
- Tampão de diluição.
- Micropipeta de 100 µL.
- Pontas de micropipeta
- Frascos vazios para pré-tratamento de amostras.
- Folheto
- Guia rápido de referência

Preparação do procedimento:

- Recolher a amostra de urina seguindo as indicações descritas no folheto do LacTEST 0,45g.
- Registrar o volume total de urina no recipiente.
- Verificar a data de validade das tiras de teste e do tampão de diluição.
- Retirar a tira teste da embalagem de alumínio com as mãos limpas e secas.
- Deixar a tira, a amostra de urina e o tampão de diluição aquecer durante 10 minutos até à temperatura ambiente (20-30°C).
- Colocar uma ponta limpa na pipeta.
- Adicionar, usando a pipeta, 100 µL do tampão de diluição a um frasco vazio.
- Sem remover a ponta da pipeta, adicionar o mesmo volume da amostra de urina ao frasco ao qual se adicionou o tampão de diluição anteriormente.
- Fechar o frasco e agitar para obter uma mistura homogénea.
- Iniciar o procedimento de análise no leitor seguindo as indicações do Manual do Utilizador do Osaxyl7000.
- Quando o leitor o indicar, inserir a tira teste e adicionar no final da mesma, com a pipeta, a mistura previamente preparada.
- Terminada a análise, o resultado aparece no display.
- Retirar a tira teste usada do leitor e descartá-la junto com o frasco e a ponta da pipeta.
- Se o leitor tiver solicitado que repita a análise com um fator de diluição mais alto, utilize uma nova tira de teste e prepare uma nova diluição da amostra de urina noutra frasco adicionando 3 volumes (300 µL) do tampão de diluição e um volume (100 µL) da amostra de urina. Iniciar o procedimento de análise no leitor seguindo as indicações do Manual do Utilizador do Osaxyl7000 para análise de amostras com fator de diluição maior.

Valores normais em crianças e adolescentes com mais de 6 anos, adultos e doentes idosos

Teste	Xilose na urina (mg)
LacTEST 0,45 g	≥ 19,18

Valores abaixo de 19,18 mg são considerados indicativos de hipolactasia.

Nota:

Considerações a ter em conta relativamente à conservação de amostras de urina e diluição:

1. Recomenda-se medir a amostra de xilose quando chega

2. Se a determinação da xilose vai ser efetuada no mesmo dia mas mais tarde, a amostra de urina deve ser conservada a 4°C.

3. Quando se utilizam volumes de urina inferiores a 150 ml e valores de xilose superiores a 10 mg/dL, deve ser utilizado um fator de diluição de 1:4.

Validação do método de quantificação de xilose na urina usando o método eletroquímico Osaxyl

	Osaxyl - urina fresca	Osaxyl - urina congelada
Extensão da curva de calibração	Desde 0,75 a 10 mg/dl	Desde 0,75 a 10 mg/dl
Linearidade	$r^2 \geq 0,9986$	$r^2 \geq 0,9952$
Limites	Limite do Branco: 0,05 mg/dl Limite de Detecção: 0,40 mg/dl Limite de Quantificação: 0,75 mg/dl	Limite do Branco: 0,05 mg/dl Limite de Detecção: 0,75 mg/dl Limite de Quantificação: 0,75 mg/dl
Precisão (coeficientes de variação)	Precisão na mesma determinação < 4,4% Precisão entre determinações < 3,5%	Precisão na mesma determinação < 4,2% Precisão entre determinações < 6,7%
Exatidão (percentagem do valor nominal)	Exatidão na mesma determinação $\leq 12,6\%$ Exatidão entre determinações $\leq 13,2\%$	Exatidão na mesma determinação $\leq 1,4\%$ Exatidão entre determinações $\leq 3,0\%$
Erro	12,6-13,2%	1,4-3%

Recomendação geral:

Quando há incerteza sobre o diagnóstico, um acompanhamento clínico irá ajudar a concluir um diagnóstico definitivo.

Quantificação de xilose usando o método manual de floroglucinol

Consiste na determinação espectrofotométrica de um composto colorido formado entre o reagente floroglucinol (1,3,5-OH-benzeno) e furfural, que é o produto da reação da xilose num meio fortemente ácido.

É indicado abaixo um protocolo validado para determinação da xilose em amostras de urina de doentes que receberam LacTEST 0,45 g, incluindo recomendações para tratamento e conservação de amostras.

Protocolo de Determinação da Xilose

Preparar:

a) 6,66 mM de solução de xilose (100 mg/dl) em água Milli Q. A partir desta solução, preparar uma solução de 0,66 mM (10 mg/dl), que será utilizada nas curvas de calibração.

b) Reagente de cor com floroglucinol.

- 0,5 g de floroglucinol
- 100 ml de ácido acético glacial
- 10 ml de ácido clorídrico.

A mistura resultante é suficiente para processar 50 amostras (50 tubos) e deve ser preparada de fresco antes da sua utilização. Depois de preparada, a mistura de reação não deve ser usada durante mais de 5 horas.

c) Preparar uma curva padrão de xilose que varie entre 0,0125 e 0,5 mg/dl (0.25 a 10 µg).

A curva padrão é expressa tanto em mg/dl como em µg de xilose, uma vez que o valor de xilose na urina é expresso como a quantidade total (mg) referente ao volume de urina colhido para cada indivíduo (são utilizadas unidades de quantidade porque o diagnóstico na urina é expressado como a quantidade total de xilose presente na urina). A solução padrão de xilose deve ser preparada de fresco no dia em que são realizadas as medições de xilose. Depois de preparada, a solução padrão deve ser utilizada no prazo de 5 horas.

	Curva-Padrão de Xilose						Amostras			
Xilose, mg/dl	0	0,0125	0,025	0,05	0,1	0,2				
	0,4	0,5								
Xilose, 10 mg/dl (µl)	-	2,5	5	10	20	40	-	-	-	
	80	100								
Urina (µl)	-	-	-	-	-	-	25	50	75	
	-						100			
Água Milli Q (µl)	100	97,5	95	90	80	60	75	50	25	
	20	-					0			
Reagente florogl. (ml)	1,9 ml	→					→			

- São utilizados tubos de polipropileno de 10 ml, resistentes a ácidos e ao calor. As amostras são adicionadas. É feita uma curva padrão de xilose, com as quantidades de xilose indicadas acima.
- O reagente floroglucinol é adicionado a cada tubo até completar um volume de 2 ml.
- Os tubos são incubados num banho a 100 °C durante 4 minutos exatos e depois arrefecidos em água.
- A absorvância a 554 nm é medida num colorímetro ou espectrofotómetro imediatamente após o arrefecimento da reação.
- O espectrofotómetro é ajustado para absorvância zero, antes da leitura das soluções padrão e amostras, com um branco de reagente contendo água e reagente floroglucinol. Este “branco de reagente” é aquecido e arrefecido juntamente com as outras amostras.
- Cálculo: A concentração de xilose na urina é calculada extrapolando os valores da curva de calibração. O volume total de urina recolhido durante 5 horas após a ingestão do produto deve ser registado, para calcular a quantidade total de xilose na urina de 5 horas.

Valores normais em adultos, doentes idosos e adolescentes com idade igual ou superior a 12 anos

Teste	Xilose na urina (mg)
LacTEST 0,45 g	≥ 37,87

Valores abaixo de 37,87 mg são considerados indicativos de hipolactasia.

Nota:

Considerações a ter em conta relativamente à conservação de amostras de urina:

1. Recomenda-se a conservação das amostras de urina para medição da xilose a 4 °C, caso a determinação seja realizada no dia; ou caso contrário, quando a medição não é realizada no dia, as amostras devem ser conservadas a -20 °C ou -70 °C (as amostras permanecerão estáveis durante, pelo menos, 2 meses após a congelação).
2. Se for necessário repetir as medições, as amostras podem ser congeladas e descongeladas pelo menos três vezes num período de 2 meses.

Relativamente às soluções de trabalho e amostras processadas de urina, os seguintes aspetos devem ser tidos em consideração:

1. O reagente de cor do floroglucinol só é estável durante 5 horas depois de misturado.
2. Depois de processadas as amostras por aquecimento na presença do reagente floroglucinol, as amostras só serão estáveis durante as primeiras três horas após o processamento.

Validação do método de medição de xilose na urina com o método manual de floroglucinol.

Extensão da Curva de Calibração:	0,5 – 20 mg/dl
Linearidade:	$y = 1,2225x + 0,0095$ $r^2 > 0,9997$
Sensibilidade:	Os limites de quantificação para amostras de urina e soro são de 0,5 mg/dl.
Reprodutibilidade:	CV entre diferentes amostras não devem ser superiores a 15%.
Precisão:	CV entre diferentes amostras não devem ser superiores a 15%.
Erro de medição:	0,48 – 6,45%

Valores de sensibilidade e especificidade dos métodos de deteção de floroglucinol, Xylossay e Osaxyl.

Método	Sensibilidade	Especificidade	Método de referência
Método de floroglucinol	0,935	0,918	Biópsia
Método enzimático	0,955	0,993	Método de floroglucinol

Método eletroquímico	0,962	0,938	Método enzimático
----------------------	-------	-------	-------------------

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Venter Pharma S.L.
c/ Almagro, 1, 1º dcha
28010 Madrid
Espanha

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

N.º de registo no INFARMED, I.P.: 5859707 – 1 saqueta

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet do INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.
<https://www.infarmed.pt/>